

赐美健-ME10 益生菌添加剂 肉鸡养殖使用方法及实验结果

一、赐美健产品介绍：

赐美健是由瑞士百福微生物公司生产的益生菌产品，经由特殊的双层包被技术处理，其菌种是在人类肠道天然存在的自然菌种，是在 1968 年被发现并分离的，因此被命名为：粪肠球菌 SF68。（欧盟登记号码：NCIB (=NCIMB) 10415）

二、赐美健的产品特点：


1、对人和动物没有毒性和肠病原性；2、对酸有高度抵抗力（可通过胃；3、世代时间短（繁殖速度快）；4、制造 L 型乳酸；5、制造类杀菌素；6、抑制病原菌的生长繁殖；7、刺激免疫系统；8、保护肠道中固有的乳酸菌群。

三、赐美健在肉鸡养殖的功效：

赐美健经由阶段性饮水投与，可以达到提高肉鸡成活率、提高饲料的日采食量、改善整体鸡群整齐度、提高日增重、改善料肉比与降低下痢发生率的效果。同时还可以作为一个生物安全措施来净化粪便减少氨气释放改善饲养环境，减少环境中有害细菌及病毒的污染。

四、添加阶段

建议依以下的程序饮水添加（有涂颜色的日龄为饮水添加日）



使用抗生素（除氯霉素、维吉尼亚霉素之外的）预防或者治疗疾病时建议同时使用赐美健，而且在停药之后继续使用两天以保证肠道菌群平衡，维护肠道的健康，促进饲料转化效率。停药之前 5 天开始连续使用直至出栏前 2-3 天。

五、使用添加剂量：

2 克/天/1000 只鸡（一次性饮用，水线太长可以分两次溶解连续添加）

六、使用方法：

1. 依照第二项「添加阶段」所安排之日程，需投与当日，将鸡舍的『饲养量 ÷ 1000 × 2』克 = 鸡舍当日所需赐美健-ME10。将赐美健-ME10 溶解于鸡的饮水中，请记得用器具搅拌至完全溶解，以确保稀释的均匀度。稀释后请确定鸡只在 1-2 小时内将含有赐美健的水喝完，以确保活菌的活性与乳头饮水器不被堵塞。
2. 免疫前中后连续使用三天促进抗应激能力。若疫苗使用饮水方式投入，则饮水免疫当日中止使用，之后连续两日使用。
3. 若免疫程序不同，则建议赐美健的停用时间间隔不超过 5 天，每次要连续使用 3-5 天。

七、记载项目：

饲料采食量、周增重、出栏体重、成活率、料肉比。

八、观察项目：

肉鸡整齐度、下痢状况、粪便状况、氨气、羽毛光泽、精神状况。

注意事项：

1. 建议将赐美健保存于 5-8℃ 或 干燥阴凉处。
2. 由于赐美健属乳酸菌，会分泌生物薄膜，所以赐美健稀释于水后，请确定水在 2 小时内用完，否则可能会堵塞饮水乳头。（使用赐美健之后可以接着使用酸化剂）
3. 与赐美健混和稀释的水不可含任何消毒剂，否则会造成菌数快速衰退。

最新例证：

赐美健阶段性饮水使用的试验结果（按照入舍雏鸡数计算平均每只鸡增收 1 元左右）

2008 年 10 月中旬中慧肉鸡场出栏肉鸡的对比结果：（43 日龄）

组别	进鸡数	出栏数	出栏重	饲料量	药费/只	成活率	均重	料肉比	增收（元/只）
赐美健	18000	16524	48964	90580	0.77	91.80%	2.963	1.85	1.08
对照组	18000	16494	46323	88940	0.83	91.63%	2.808	1.92	

2009 年 2 月上旬中慧肉鸡场出栏肉鸡的对比结果：（1、2 舍 41 日龄；3 舍 39 日龄，4 舍 38 日龄）

组别	进鸡数	出栏数	出栏重	饲料量	药费/只	成活率	均重	料肉比	增收（元/只）
1 赐美健	16000	15579	34490	64260	1.05	97.37%	2.214	1.86	0.81
2 对照组	16000	14684	33230	65810	1.05	91.78%	2.263	1.98	
3 赐美健	16000	15230	32050	61680	1.05	95.19%	2.104	1.92	1.55
4 对照组	16000	14377	27970	59000	1.05	89.86%	1.945	2.11	

青岛康瑞达商贸有限公司 / 台湾旭格有限公司
电话：(0532) 82022883 传真：(0532) 82023018
e-mail: wangxuebao@126.com qdkrd@126.com

青岛市市南区中山路百盛国际商务中心 3115 室
联络人：王学宝 13906422327/李守坤 13954215863
www.dwyybj.com www.动物营养保健.com

旭格有限公司

11491 台北市内湖区瑞光路 258 巷 2 号 3 楼之 3

Tel: (02) 2658-0101 Fax: (02) 2658-0202 Email: shih.ger@msa.hinet.net